

PUBLICATION PERIODIQUE

## EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIEGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,  
HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Rue St-Jean prolongée - B.P. n° 20 - 31130 BALMA - (Tél. 24.06.51)

## ABONNEMENT ANNUEL

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hta-Gne

C.C.P. 8612-11 R TOULOUSE

## - BULLETIN TECHNIQUE N° 164 - EDITION GRANDES CULTURES -

21 mai 1980

/ B L E /

Stade moyen 10-2 à 10-3 (épiaison).

SEPTORIOSE - ROUILLE BRUNE et FUSARIOSE

Nous rappelons qu'une intervention doit être envisagée à l'épiaison (stade 10-3) lorsque septoriose et rouille brune sont observées sur la feuille n° 3 (3ème feuille en partant de l'épi).

Dans la plupart des cas, ces deux maladies sont maintenant associées. En outre, la fusariose est présente sur gaines et tiges de la base dans 80 % des parcelles observées, et les céréales sont actuellement au stade de plus grande sensibilité au passage de cette maladie sur épis.

En conséquence, lorsque l'intervention est justifiée, il est conseillé d'utiliser de préférence une spécialité efficace à la fois contre septoriose, rouille brune et fusariose :

- spécialités à base de carbendazime + manèbe (nombreuses)
- spécialités à base de carbendazime + mancozèbe (EPIDOR P à 3,7 kg/ha ; MILKUR à 4,3 kg/ha ; KOMBAT à 3 kg/ha)
- spécialité à base de captafol + triadiméfon (BAYLETON CF EPI à 2 kg/ha).

PUCERONS

La présence des premiers pucerons sur épis (SITOBION AVENAE) est notée dans quelques parcelles, mais il n'y a pas lieu d'envisager de traitement dans l'immédiat.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription Phytosanitaire  
"MIDI-PYRENEES",

J. TOUZEAU.-

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : P. JOURNET.

C.P.P.A.P. - N° 532 A.D.

P 216